M2BPGi 검사의 유용성

만성 바이러스 감염에서의 M2BPGi

- 초기 섬유화(F2) 감별에 특히 유용함
- 만성 바이러스 감염 환자에서 치료 후 간염유화 호전 예측과 관련 있음

간세포암종에서의 M2BPGi

- M2BPGi 높은 농도를 보이는 경우 간세포암종 발생과 높은 연관성을 보임
- 만성 바이러스 감염 환자에서 치료 후 간염유화 호전 예측과 관련 있음

비알코올 지방간에서의 M2BPGi

- 비알코올 지방간에서 간염유화 정도 예측
- 다른 간염유화 예측지표와 함께 또는 순차적으로 측정된 M2BPGi 농도로 간염유화 정도 예측

Screening 목적으로의 M2BPGi

- 간염증 수치가 정상이어도 섬유화 검사에서 양성을 보임
- 기존의 간염유화 예측 모델 (FIB-4, NFS)과 M2BPGi 병합 또는 순차 사용은 **간질환 고위험군 선별에 유용함**
- 당뇨병 환자에서 M2BPGi 농도가 높은 경우 진행된 간염유화의 위험도가 높음

5. 간염유화 단계별 M2BPGi 농도

6. M2BPGi 관련 보건복지부 고시 현황

- 「신의료기술의 안전성·유효성에 대한 평가결과 고시」, 보건복지부 고시 제2017-57호, 2017.03.28.
- 급여인정 고시
「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 일부개정, 보건복지부 고시 제 2018-181호, 2018.08.27.
- 선별급여 본인 부담 80% 인정
「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」(항목: M2BPGi [정밀면역검사]) 보건복지부 고시 제2018-183호, 2018.08.27. (본인부담률 80%)

References

- Huiyul Park, Dae Won Jun2, Hoon-Ki Park, Mimi Kim, Clinical implications of serum Mac-2-binding protein glycan isomer as a novel biomarker of advanced hepatic fibrosis in diabetes. Ann Transl Medicine. 2020; Dec;8(23):1583.
- Eun-Hee Nah, Seon Cho,Suyoung Kim, Hye-Sun Kim, Han-Ik Cho2,Diagnostic performance of Mac-2 binding protein glycosylation isomer (M2BPGi) in screening liver fibrosis in health checkups;Hepatol Res. 2020; Jan;26(1):33-44.
- M2BPGi 간 섬유화 검사[화학발광효소면역측정법], 신의료기술평가보고서 HTA-2017-14 (2017.04),보건복지부,신의료기술평가위원회
- 2020년 사망원인통계 결과, 통계청보도자료 2021.09.28.(화) 12:00(보도일시)
- Takako Inoue1 and Yasuhito Tanaka, Novel biomarkers for the management of chronic hepatitis B, Clinical and Molecular Hepatology 2020;26:261-279

만성 간질환자 대상 [간염유화 선별검사]
M2BPGi 검사
Mac-2 Biniding Protein Glycosylation isomer

1. 간(Liver fibrosis)

간은 인체에서 가장 큰 장기로 무게 1.2~1.4Kg 이며, 위치는 오른쪽 갈비뼈로 싸여있고, 횡경막 아래 복부 내 위치합니다.

간의 기능

- 영양분 처리
- 지방과 지용성 비타민의 흡수를 돕는 담즙 생성
- 인체의 독소 제거

2020년 사망통계로 본 사망원인 순위 - 출처: 2020년 사망원인 통계, 통계청 (2021.9.27 보도자료)

10대 사망 원인 중 8번째 사망원인으로 간질환이 차지하였으며, 연령별 간질환 사망통계 순위는 40대에서 3위로 가장 높았고, 30대 및 50대에서 4위, 60대에서 5위를 차지하였습니다. 사망원인 1위인 악성신생물(암) 중에서 간암에 의한 사망률이 2위로 보고되었으며, 30대 이후 간질환 및 간암으로의 진행 예방 및 관리가 매우 중요합니다.

* 악성신생물(암) 사망률 추이, 1983-2020

2. 간염유화(Liver fibrosis)란?

여러 종류의 간 손상(바이러스성 간염, 알코올성 간염, 약제, 비알코올성 간질환, 자가면역성 질환 등)에 의한 상처재생 과정의 결과로 일어나는 현상으로 **만성적인 상처와 염증에 의해 정상적인 간조직이 딱딱해지는 것**을 말하며 결국 간의 구조적 이상을 초래하여 경변증으로 진행하게 될 수 있습니다. 이러한 원인에 의해 지속되는 **간염유증(hepatic fibrosis)과정을 거쳐 간경변**이 유발되므로 간염유화 과정을 이해하고 연구하는 것은 간경변 유발 질환을 해결하는 데 가장 기본적이고 중요한 단계입니다.

3. 만성 간질환이란?

만성 간질환이란 다양한 원인에 의해 간경변과 간암으로 진행되는 질환으로 대표적인 원인은 **바이러스 간염(B형, C형 간염), 알코올성 간질환, 비알코올성 간질환** 등이 있습니다.

만성 간질환 환자

- 바이러스성 간질환 : 주로 C형 간염, B형 간염
- 비알코올성 간질환 : 지방간, 간염, 간경변
- 알코올성 간질환 : 지방간, 간염, 간경변(liver cirrhosis)
- 기타 : 자가 면역, 윌슨 병(Wilson's disease)

만성 간질환 진료 가이드라인 (대한간학회 자료 참조)

대한간학회	적 용	근 거
2022년 만성B형간염 진료 가이드	B형 간염 치료 모니터링 M2BPGi 사용	간염유화 심각성은 간 조직생검 or 혈액검사 (예> APRI, FIB-4 index, M2BPGi)를 활용한 비침습적 검사방법 또는 Fibroscan을 사용하여 평가할 수 있음
	치료 전 간염유화 확인 M2BPGi 사용	B형 간염 면역 관용기(Immune-tolerant phase)는 일반적으로 간염유화가 없는 것이 특징이지만 비침습적 검사방법(예> APRI, FIB-4 index, M2BPGi) 또는 Fibroscan 으로 간염유화 소견이 보이면 항바이러스 치료를 고려해야 함
2021년 비알코올 지방간질환 진료 가이드	진행된 간염유화 감별	간염유화스캔, FIB-4, NFS를 통해 중간 위험군(intermediate risk) 이상으로 분류되는 경우 알고리즘을 통해 진행된 간염유화가 의심되면, 간염유화 재평가를 위한 추가검사(예>AsAGP, ELF, SWE, MRE, M2BPGi) 또는 간 조직검사 시행할 수 있음

4. 간염유화 선별검사 M2BPGi(Mac-2 Biniding Protein Glycosylation isomer)

M2BPGi 검사

검사명(코드)	M2BPGi (KCL : 5402)
검사방법	CLEIA
검체정보	Serum 1.0mL
검사일정	월-금 / 1일
보험정보	누198 / D1980000Z (질가산 제외)

Mac-2 Binding Protein Glycosylation isomer(**M2BPGi**)는 혈액 속에 아주 작은 크기의 단백질이 모여 당쇄(Sugar chain)라고 불리는 특별한 구조를 이루며 존재하는 것을 말하며, **간염유화가 진행되면 당쇄 구조가 변하면서 M2BPGi가 증가**하게 됩니다. 간염유화가 진행되면 변하는 당쇄구조에 반응하는 lectin을 이용하여, **혈액 속에 존재하는 M2BPGi를 측정해 간염유화를 진단하는 방법**입니다.

세포의 상태에 따라 서로 다른 glycosyltransferase gene에 의해 glycosylation 과정이 일어납니다. 따라서 **fibrosis가 진행된 간세포에서는 glycan이 glycosylation된 상태로 혈액에 방출**되는데 이형태의 단백질이 M2BPGi입니다.

M2BPGi 검사 결과 해석

M2BPGi 결과는 COI 값 (보고가능 범위 0.1~20.0)과 음성 또는 양성으로 보고되며, 결과가 양성인 경우 비정상적인 간염유화 또는 간경변증 소견을 예측하므로 진료를 통하여 추가적인 관리가 필요합니다.